



ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΕΖΙCLEN®


Τρόπος χορήγησης²




1 Ανοίξτε τη μία φιάλη ΕΖΙCLEN® και μεταφέρετε το περιεχόμενο στο κύπελλο.



2 Προσθέστε νερό στο φάρμακο έως όπου το επίπεδο του διαλύματος φτάσει μέχρι τη γραμμή (περίπου 0,5L).



3 Πιείτε το διάλυμα 1/2 - 1hr



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

4 Πιείτε άφθονα υγρά



Επιναλλάξτε τα βήματα 1 έως 4 για τη 2η φιάλη.

Η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί 3 ώρες πριν την έναρξη της ενδοσκοπήσης.

Το Eziclen® μπορείτε να το πάρετε με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα αν το ραντεβού σας είναι πρωινό ή απογευματινό^{1,2}

ΠΡΩΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βρόδυ πριν την εξέταση



Πρωί της εξέτασης

Την ημέρα πριν την εξέταση:

Ξεκινήστε στις 16:00 την 1η φιάλη καθαρτικού σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες. Μετά 3 ώρες, στις 19:00 πιείτε τη 2η φιάλη.

Απο τις 15:00 - 24:00 πιείτε άφθονα υγρά (τουλάχιστον 8 - 10 ποτήρια).

Επιτρέπονται όλα τα υγρά, εκτός από γάλα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βρόδυ πριν την εξέταση



Πρωί της εξέτασης



Την ημέρα πριν την εξέταση:



Ξεκινήστε στις 18:00 να πιείτε την 1η φιάλη καθαρτικού σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες. Πιείτε μέχρι τις 24:00 άφθονα υγρά (τουλάχιστον 6 - 8 ποτήρια). Επιτρέπονται όλα τα υγρά, εκτός από γάλα

Την ημέρα της εξέτασης:

Στις 06:00 πιείτε τη 2η φιάλη.

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ^{1,2}

Την ημέρα πριν από την εξέταση, μπορείτε να καταναλώσετε ένα ελαφρύ πρόγευμα. Μετά το πρόγευμα, μην πιείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από διαυγή υγρά.

	 ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ	 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ	Καφές ή τσάι ΧΩΡΙΣ γάλα ή κρέμα	Καφές ή τσάι ΜΕ γάλα ή κρέμα
ΚΡΥΑ ΠΟΤΑ	Σουρωμένοι χυμοί φρούτων (χωρίς πορτό) Ανθρακούχα αναψυκτικά Μη ανθρακούχα αναψυκτικά ...και νερό	Χυμοί φρούτων με πορτό Αθλητικού ποτά Υγρά κόκκινου ή μωβ χρώματος
ΦΑΓΗΤΟ	Διαυγείς σούπες Σορμπέ, γρανίτα, ζελέ Μέλι, ζάχαρη, μαρμελάδες	Σούπες με στερεά Παγωτό

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ : Δηλώνω υπεύθυνα ότι, εάν κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης (Γαστροσκόπηση ή/και Κολonosκόπηση) ανευρεθούν πολύποδες και ο Γαστρεντερολόγος κρίνει απαραίτητη και δυνατή την ενδοσκοπική αφαίρεσή τους, αποδέχομαι / δεν αποδέχομαι (βάλτε σε κύκλο το αντίστοιχο) την οικονομική μου επιβάρυνση, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της κλινικής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ, ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕ :
Καρδιολογικό πρόβλημα , Νεφρική ανεπάρκεια , Λαμβάνετε αντιπηκτικά ή/και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα , Γνωστή αλλεργία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Να οδηγήσετε ή να εργαστείτε 5 ώρες μετά την εξέτασή σας.

- ΟΛΙ** - ΜΗΝ τρώτε στερεή τροφή μετά το πρόγευμα την ημέρα πριν την εξέταση
- Ι** - ΜΗΝ πιείτε το περιεχόμενο των φιαλών πριν τα αραιώσετε